

Fugos®

Flubendazol

Tableta
Suspensión

Vía Oral

Antihelmíntico.

Composición

Fugos® 300 mg Tableta: Cada tableta contiene: Flubendazol 300 mg.

Excipientes: Alcohol etílico USP, celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, almidón de maíz, estearato de magnesio, lactosa monohidrato y agua purificada USP.

Fugos® 600 mg Suspensión: Cada 30 ml contiene: Flubendazol 600 mg.

Excipientes: Alcohol etílico USP, azúcar refinada, ácido cítrico anhidro USP, carboximetil celulosa sódica, cloruro de sodio USP, docusato sódico solución al 72.5%, esencia de banana, metilparabeno sódico, mentol, propilparabeno sódico, sacarina sódica USP, sorbitol al 70%, veegum y agua purificada.

Acción Farmacológica

Fugos® es un derivado sintético parafluorado benzimidazólico con actividad antihelmíntica contra nematodos y cestodos, siendo activo contra: *Enterobius*

vermicularis, *Áscaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus* y *Strongyloides stercoralis*.

Mecanismo de Acción

Fugos® ejerce su acción en los microtúbulos de absorción de las células del parásito, provocando así la degeneración de estas células, inhibiendo la formación de tubulina celular para impedir la asimilación de glucosa y alterar las funciones digestivas, provocando su lisis. **Fugos®** no afecta los microtúbulos del huésped y actúa exclusivamente a nivel luminal, por lo que es ideal en el tratamiento de helmintiasis humana.

Indicaciones

Antihelmíntico de amplio espectro, indicado en ascariasis, oxiuriasis, uncinariasis, tricocefalosis, estrongiloidiasis y anquilostomiasis.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Flubendazol. Contraindicado en el embarazo o cuando se sospeche su existencia y lactancia. Niños menores de dos años de edad.

Advertencias y Precauciones

Fugos® no debe ser administrado en mujeres embarazadas.

No se han realizado estudios sobre el efecto de **Fugos®** al conducir vehículos u operar maquinaria. Sin embargo, los pacientes que experimentan somnolencia luego de recibir **Fugos®**, deberían abstenerse de manejar vehículos y de operar maquinaria.

Interacciones

No se han descrito interacciones con otras drogas.

Embarazo y Lactancia

La experiencia en humanos no ha mostrado un aumento en el riesgo de malformación. Sin embargo, se debe evitar el uso del **Fugos®** en mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas. Debido a la falta de datos sobre el paso de la leche materna, no se debe administrar durante el período de lactancia.

Reacciones Adversas

Fugos® es un fármaco bien tolerado basado sobre todo en su baja absorción. Por su acción exclusiva en la luz del intestino, raramente se han observado reacciones adversas similares al mareo, dolor abdominal, náuseas y diarrea.

Sobredosis

En caso de sobredosis intencional o por error de administración pueden producirse síntomas como: calambres abdominales, náuseas, vómitos y diarrea. Se han reportado raramente trastornos reversibles de la función hepática, hepatitis y discrasias sanguíneas descritos en pacientes tratados por hidatidosis con dosis masivas durante períodos extendidos. No hay un antidoto específico. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.

Dosis e Instrucciones de uso

- Parasitosis sin riesgo de autoinfestación o reinfestación.

Adultos: 2 tabletas de 300 mg cada una, en una sola toma por un día.

Niños: 30 ml en 1 sola toma o 15 ml durante dos días consecutivos.

- Parasitosis con riesgo de autoinfestación o reinfestación

Adultos: 1 tableta de 300 mg en el día durante 2 días.

Niños: 15 ml en el día durante 2 días.

Presentaciones

Tabletas:

Caja x 1 Blíster x 2 Tabletas

Caja x 2 Blísters x 2 Tabletas c/u

Caja x 1 Blísters x 4 Tabletas

Caja x 5 Blísters x 2 Tabletas c/u

Suspensión:

Caja x 1 Frasco x 30 ml

Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA. TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C.

Elaborado por **Procaps S.A.** Calle 80 Nro. 78 B-201, Barranquilla – Colombia.

Importado y Distribuido por **Laboratorios Siegfried S.A.** Av. República de El Salvador N 34-493 Y Av. Portugal, Torre Gibraltar, Pb, Quito – Ecuador.



SIEGFRIED