

# Muvett®

## Trimebutina Maleato

Cápsula

Tableta de liberación prolongada

Vía Oral

Anticolinérgico.

### Composición

**Muvett® 200 mg Cápsula:** Cada cápsula contiene: Trimebutina Maleato 200 mg. Excipientes: Goma guar, celulosa 100%, celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, gelatina, azul N°1, amarillo N°6, rojo N°40, dióxido de titanio y agua.

**Muvett® 300 mg Retard Tableta:** Cada tableta de liberación prolongada contiene: Trimebutina Maleato 300 mg. Excipientes: Polivinil acetato/Polivinilpirrolidona, talco, dióxido de silicio coloidal, polivinilpirrolidona, estearato de magnesio, alcohol etílico, lactosa spray dried, celulosa microcristalina 102, opadry blanco, amarillo N°10, amarillo N°6 y agua purificada USP.

### Acción Farmacológica

Trimebutina Maleato tiene acción antiespasmódica y analgésica sobre los síndromes espásticos y dolorosos del sistema digestivo. Regula la motricidad

gastrointestinal ya que ejerce una acción estimulante sobre el músculo liso hipokinético y acción espasmolítica sobre el músculo liso hiperquinético. Estas acciones están mediadas por su actividad agonista sobre receptores encefalínérgicos excitatorios e inhibitorios respectivamente.

### Mecanismo de Acción

Bloqueante selectivo de los receptores muscarínicos de acetilcolina en órganos correspondientes. Tiene acción antidopaminérgica.

### Indicaciones

**Muvett®** está indicado en el manejo sintomático del dolor relacionado con trastornos funcionales del tracto gastrointestinal y de las vías biliares. Trastornos del tránsito y molestias intestinales relacionadas con alteraciones funcionales intestinales.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la Trimebutina Maleato. Contraindicado en glaucoma, hipertrofia prostática.

### Advertencias y Precauciones

Se recomienda no administrar durante el embarazo y lactancia. No administrar a pacientes con glaucoma e hipertrofia prostática. **Muvett® 300 mg Retard Tableta** contiene lactosa, los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa (deficiencia de lactasa de Lapp o de mala absorción de lactosa- galactosa) no deben ingerir este medicamento. No se han realizado estudios sobre el efecto de **Muvett®** al conducir vehículos u operar maquinaria. Sin embargo, los pacientes que experimentan somnolencia luego de recibir **Muvett®**, deberían abstenerse de manejar vehículos y operar maquinaria.

### Interacciones

No se han descrito interacciones peligrosas en la coadministración con otros medicamentos.

•**Sustancias colinérgicas:** Pueden antagonizar los efectos de Trimebutina Maleato.

•**Antiácidos alcalinos:** La administración concurrente con antiácidos alcalinos puede interferir con el efecto terapéutico de Trimebutina Maleato, por lo tanto se recomienda administrar los fármacos alcalinos luego de al menos 3 horas de la ingesta de Trimebutina Maleato.

## Embarazo y Lactancia

**Embarazo:** El paso de Trimebutina Maleato a través de la placenta es mínimo y en estudios con animales no se han evidenciado efectos embriotóxicos o teratogénicos; no obstante dado que no se dispone de estudios controlados en mujeres embarazadas se recomienda evitar el uso durante el primer trimestre.

**Lactancia:** En ausencia de datos sobre el paso de Trimebutina Maleato en la leche materna, se recomienda evitar su uso durante la lactancia.

## Reacciones Adversas

Las reacciones adversas más comunes son:

- **Gastrointestinales:** Sequedad bucal, diarrea y dispepsia.
- **Sistema nervioso central:** Somnolencia, mareos, sensación de frío/calor y cefaleas.
- **Reacción alérgica:** Rash.

## Sobredosis

Hasta la fecha no se han reportado manifestaciones de sobredosis. No obstante en caso de una sobredosis accidental o por error de administración se deberá suspender la administración de Trimebutina Maleato, realizar un cuidadoso seguimiento del paciente e instituir tratamiento sintomático. Antídoto: Fisostigmina. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.

## Dosis e Instrucciones de uso

### Adultos:

**Muvett® 200 mg Cápsula:** 1 a 3 cápsulas al día.

**Muvett® 300 mg Retard Tableta:** 1 tableta al día preferiblemente con el almuerzo, en algunos pacientes es necesario incrementar la dosis a 1 tableta 2 veces al día en intervalos regulares.

\*La dosis diaria no deberá exceder los 600 mg.

## Presentaciones

### Muvett® 200 mg:

Caja x 1 blíster x 5 cápsulas

Caja x 1 blíster x 7 cápsulas

Caja x 2 blísteres x 5 cápsulas c/u

Caja x 14 cápsulas x 2 blísters x 7 cápsulas c/u

Caja x 15 cápsulas x 3 blísters x 5 cápsulas c/u

Caja x 21 cápsulas x 3 blísters x 7 cápsulas c/u

Caja x 30 cápsulas x 6 blísters x 5 cápsulas c/u

Caja x 28 cápsulas x 4 blísters x 7 cápsulas c/u

Caja x 30 cápsulas x 3 blísters x 10 cápsulas c/u

### Muvett® 300 mg Retard tableta:

Caja x 1 blíster x 10 tabletas c/u

Caja x 2 blísters x 10 tabletas c/u

Caja x 3 blísters x 10 tabletas c/u

**Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.**

**VENTA BAJO RECETA MÉDICA. TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C.**

Elaborado por: **Laboratorios Procaps S.A.** Calle 80 Nro. 78 B-201, Barranquilla – Colombia.

Importado y Distribuido por: **Laboratorios Siegfried S.A.** Av. República de El Salvador N 34-493 Y Av. Portugal, Torre Gibraltar, Pb, Quito – Ecuador.

