



Descan® 300

Extracto de insaponificables de *Persea americana* (Palta/Aguacate) 100 mg

Extracto de insaponificables de *Glycine max* (Soja/Soya) 200 mg

Cápsula

Vía Oral

Actúa sobre el tropismo del tejido conectivo.

Lea todo el prospecto antes de empezar a usar este producto

Si necesita información adicional, consulte a su médico o farmacéutico.

Composición:

Extracto de insaponificables de *Persea americana* (Palta/Aguacate) 100 mg, Extracto de insaponificables de *Glycine max* (Soja/Soya) 200 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina, Dióxido de silicio, Butil hidroxitolueno, Almidón glicolato sódico, Estearato de magnesio, Talco.

Indicaciones Terapéuticas

Según evidencias de uso tradicional o científicas presentadas a tal fin, está indicado en:

- **Reumatología:** Tratamiento sintomático de acción lenta de la osteoartritis y artrosis de cadera y rodilla, gracias a que disminuye la inflamación de los tejidos, el dolor y para detener la evolución de la enfermedad reumática.
- **Odontología:** Tratamiento adyuvante de la periodontitis (enfermedad inflamatoria que afecta a los tejidos que hay alrededor de los dientes).

Dosificación y modo de administración

• Limitaciones de uso y tiempo

Descan® 300, se administra por vía oral. La dosis habitual es de una cápsula por día, junto con alguna de las comidas. Se sugiere ingerir la cápsula con un vaso grande de agua.

Información necesaria antes de tomar el producto

En ocasiones, se ha reportado ardor estomacal, reflujo y regurgitaciones, por lo que si ha sufrido de estos síntomas o enfermedades digestivas debe de consultar a su médico.

Si recibe alguna otra medicación, está embarazada, cree que puede estar embarazada, está dando de amamantar o es una persona mayor, consulte a su médico antes de tomar **Descan® 300**.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a algunos de sus componentes.

Advertencias y precauciones

Este medicamento fue indicado para una indicación determinada, por lo cual:

- No debe ser tomado para otras indicaciones.
- No debe ser recomendado a otras personas.

Embarazo y lactancia

No existen datos suficientes para evaluar un eventual efecto teratogénico o fetotóxico. Por lo tanto, no está recomendada su administración durante el embarazo ni la lactancia. Si usted está embarazada o dando de lactar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:

No se han realizados estudios sobre el efecto de **Descan® 300** al conducir vehículos y operar maquinaria, sin embargo, los pacientes que experimenten somnolencia luego de recibir el medicamento deberían abstenerse de operar maquinaria y conducir vehículos.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción

Si usted está tomando algún medicamento, consulte con su médico antes de ingerir este producto. No se han descrito interacciones riesgosas. Para evitar eventuales interacciones con otros medicamentos, es conveniente que el paciente comunique al médico acerca de cualquier otro tratamiento en curso.



Poblaciones especiales

- **Uso en pediatría:** Se desaconseja su uso ya que no hay datos suficientes que avalen la seguridad en menores de 18 años.
- **Uso en geriatría:** No se dispone de información para pacientes de edad avanzada. Consulte a su médico antes de consumir este producto.

Reacciones adversas

Las reacciones adversas que se pueden observar son principalmente a nivel gastrointestinal.

• **Poco frecuentes:**

- Regurgitaciones con olor lipídico. Éstas se pueden evitar al ingerir las cápsulas junto con las comidas.
- Reacciones en la piel (eczema, urticaria, fotosensibilidad)

• **Raras:**

- Incremento de las enzimas hepáticas en sangre (transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina, gammaglutamil transpeptidasa).
- Reacciones de hipersensibilidad.

• **Frecuencia desconocida:**

- Diarrea, náuseas, constipación.
- Epigastralgia.

Sobredosificación

No se han descrito hasta el momento casos de sobredosis. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.

Presentaciones comerciales

Caja x 1 blíster x 10 cápsulas + Inserto

Caja x 2 blísteres x 10 cápsulas c/u + Inserto

Caja x 3 blísteres x 10 cápsulas c/u + Inserto

VENTA LIBRE

SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN, CONSULTE A SU MÉDICO.

TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.

Este producto puede obtenerse sin prescripción médica, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico.

No obstante, debe utilizar con cuidado este producto para obtener los mejores resultados.

En el caso de presentar efectos adversos, comunicarse inmediatamente con la ARCSA y con el Titular del Registro Sanitario.

Elaborado por **Roemmers S.A.I.C.F.** Buenos Aires-Argentina
Importado y Distribuido por **Laboratorios Siegfried S.A.**, Av. República de El Salvador N34-493 y Av. Portugal. Quito - Ecuador.

Rev.01/08-2023

