

Levocet® Forte Jarabe

Levocetirizina Diclorhidrato
5 mg/5 mL

Solución
Vía Oral

Antihistamínico - Antialérgico

Composición

Cada 100 mL de solución contiene: Levocetirizina Diclorhidrato 0,100 g. Excipientes: benzoato de sodio granular, sorbitol, sacarina sódica, citrato de sodio, saborizante cereza, agua purificada c.s.

Indicaciones terapéuticas

Levocet® Forte jarabe 5 mg / 5 mL es un medicamento antialérgico.

Para el tratamiento de los síntomas de enfermedad alérgica como:

- Rinitis alérgica (incluyendo la rinitis alérgica persistente)
- Urticaria

Dosificación y forma de administración

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

La dosis recomendada es:

- Adultos y adolescentes a partir de los 12 años: 5 mL de solución (5 mg) una vez al día.
- Uso en niños
- Niños entre 6 y 12 años: 2,5 mL de solución (2,5 mg) una vez al día.
- Niños entre 6 meses y 5 años: 1,25 mL de solución (1,25 mg) una vez al día.

No se recomienda la administración de **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL a niños menores de 6 meses de edad.

Instrucciones especiales de dosificación para poblaciones específicas

• Insuficiencia renal y hepática

Los pacientes con insuficiencia renal deben recibir una dosis menor de acuerdo con la gravedad de su enfermedad renal, y en niños la dosis se escogerá también en función del peso corporal; la dosis la decidirá su médico.

Los pacientes que tienen una enfermedad de riñón grave que requiere diálisis no deben tomar **Levocet® Forte**.

Los pacientes con únicamente insuficiencia hepática pueden tomar la dosis de prescripción normal.

Los pacientes con insuficiencia hepática y renal deben tomar una dosis inferior en función de la gravedad de su enfermedad renal, y en niños la dosis estará también en función del peso corporal; la dosis a tomar la determinará su médico.

• Pacientes a partir de 65 años de edad

En ancianos no es necesario ajustar la dosis si su función renal es normal.

Forma de administración

Sólo administrar por vía oral.

En la caja se adjunta una jeringa dosificadora. La solución se puede tomar sin diluir o diluida en un vaso de agua.

Levocet® Forte jarabe 5 mg / 5 mL se puede tomar tanto en ayunas como con alimentos.

Limitaciones de uso y tiempo

La duración del tratamiento depende del tipo, duración y curso de los síntomas, y es su médico quien debe determinarlo.

Su médico podría recomendar una dosificación diferente a la que se encuentra en este inserto, asegúrese de seguir las indicaciones que le haya dado.

No suspenda el tratamiento que le haya prescrito su médico a menos que él se lo indique.

Información necesaria antes de tomar el producto

Lea todo el inserto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta reacciones adversas, consulte a su médico, incluso si se trata de reacciones adversas que no aparecen en este inserto.

Contraindicaciones

No tome **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL si se encuentra en una de las siguientes situaciones:

- Si es alérgico a levocetirizina, cetirizina, hidroxicina o a alguno de los demás componentes de este medicamento.
- Si padece una enfermedad de riñón grave que requiere diálisis.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL.

Si tiene algún factor condicionante que le incapacite para vaciar la vejiga urinaria (como médula espinal dañada o aumento del tamaño de la próstata) por favor, informe a su médico.

Si es epiléptico o tiene riesgo de convulsiones, por favor consulte a su médico ya que el uso de **Levocet® Forte** puede agravar las crisis.

Si va a realizarse alguna prueba alérgica, pregunte a su médico si tiene que interrumpir el tratamiento con **Levocet® Forte** varios días antes. Este medicamento puede afectar los resultados de la prueba alérgica.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Efectos sobre la capacidad para conducir y manejar maquinaria

Algunos pacientes tratados con **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL pueden experimentar somnolencia/ adormecimiento, cansancio y agotamiento. Tenga cuidado si va a conducir o utilizar maquinaria hasta saber cómo puede afectarle esta medicación.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Toma Levocet® Forte jarabe 5 mg / 5 mL con alimentos, bebidas y alcohol

Se recomienda precaución si se toma **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL al mismo tiempo que alcohol u otros agentes que actúen en el cerebro.

En pacientes sensibles, la toma simultánea de **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL con alcohol u otros medicamentos que actúen en el cerebro puede causar una disminución adicional de la capacidad de atención y disminuir el rendimiento. Se pueden tomar **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL tanto en ayunas como con los alimentos.

Poblaciones especiales

- **Uso en pediatría:** No se recomienda el uso de **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL en niños menores de 6 meses.
- **Uso en geriatría:** Dado que la Levocetirizina se elimina mayoritariamente por la orina, la dosis del fármaco debe ajustarse de acuerdo con la función renal en pacientes de edad avanzada.

Reacciones adversas

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Si experimenta cualquier tipo de reacción adversa, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles reacciones adversas que no aparecen en este inserto.

- **Frecuentes:** pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas. Sequedad de boca, dolor de cabeza, cansancio y somnolencia/modorra.
- **Poco frecuentes:** pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas. Agotamiento y dolor abdominal.
- **Frecuencia no conocida:** No puede estimarse a partir de los datos disponibles. Se han descrito otros efectos adversos

como palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia), convulsiones, hormigueos, mareos, síncope, temblor, disgeusia (alteración del sentido del gusto), sensación de rotación o movimiento, alteraciones visuales, visión borrosa, crisis oclúgira (movimientos circulares incontrolados de los ojos), dolor o dificultad al orinar, incapacidad para orinar, edema, prurito (picor), sarpullido, urticaria (hinchazón, enrojecimiento y picor de la piel), erupción en la piel, pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA), respiración entrecortada, incremento de peso, dolor muscular, dolor articular, comportamiento agresivo o agitado, alucinación, depresión, insomnio, pensamientos recurrentes o preocupación con el suicidio, pesadillas, hepatitis, función hepática anormal, vómitos, aumento del apetito, náuseas y diarrea. Prurito (picor intenso) cuando se interrumpe el tratamiento, prurito de rebote.

- Ante los primeros signos de reacción de hipersensibilidad, deje de tomar **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL e informe a su médico.

Los síntomas de la reacción de hipersensibilidad pueden incluir: hinchazón de la boca, lengua, cara y/o garganta, dificultad para respirar o tragar (opresión en el pecho o pitidos), habones, disminución repentina de la presión sanguínea que puede derivar en colapso o estado de shock, los cuales pueden ser mortales.

Sobredosis

- **Síntomas:** Si toma más **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL del que debe, en adultos puede causar somnolencia. En niños puede dar inicialmente agitación e inquietud seguido por somnolencia.
- **Tratamiento:** Si usted cree que ha tomado una sobredosis de **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL, informe a su médico quien decidirá la acción a tomar. No existe ningún antídoto específico conocido contra la levocetirizina. De producirse sobredosis, se recomienda acudir al hospital más cercano. El lavado gástrico se podrá realizar poco después de la ingesta del medicamento. La levocetirizina no se elimina de forma efectiva por hemodiálisis.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano.

Presentaciones comerciales

Caja + Frasco x 180 mL + Jeringa dosificador + Inserto

Caja + Frasco x 120 mL + Jeringa dosificador + Inserto

VENTA LIBRE

Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Elaborado por **Laboratorios Siegfried S.A.**, Guayaquil - Ecuador
Distribuido por **Laboratorios Siegfried S.A.**, Av. República de El Salvador N34-493 y Av. Portugal. Quito - Ecuador.



SIEGFRIED

Si tiene algún factor condicionante que le incapacite para vaciar la vejiga urinaria (como médula espinal dañada o aumento del tamaño de la próstata) por favor, informe a su médico.

Si es epiléptico o tiene riesgo de convulsiones, por favor consulte a su médico ya que el uso de **Levocet® Forte** puede agravar las crisis.

Si va a realizarse alguna prueba alérgica, pregunte a su médico si tiene que interrumpir el tratamiento con **Levocet® Forte** varios días antes. Este medicamento puede afectar los resultados de la prueba alérgica.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Efectos sobre la capacidad para conducir y manejar maquinaria

Algunos pacientes tratados con **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL pueden experimentar somnolencia/ adormecimiento, cansancio y agotamiento. Tenga cuidado si va a conducir o utilizar maquinaria hasta saber cómo puede afectarle esta medicación.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Toma Levocet® Forte jarabe 5 mg / 5 mL con alimentos, bebidas y alcohol

Se recomienda precaución si se toma **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL al mismo tiempo que alcohol u otros agentes que actúen en el cerebro.

En pacientes sensibles, la toma simultánea de **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL con alcohol u otros medicamentos que actúen en el cerebro puede causar una disminución adicional de la capacidad de atención y disminuir el rendimiento. Se pueden tomar **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL tanto en ayunas como con los alimentos.

Poblaciones especiales

- **Uso en pediatría:** No se recomienda el uso de **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL en niños menores de 6 meses.
- **Uso en geriatría:** Dado que la Levocetirizina se elimina mayoritariamente por la orina, la dosis del fármaco debe ajustarse de acuerdo con la función renal en pacientes de edad avanzada.

Reacciones adversas

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Si experimenta cualquier tipo de reacción adversa, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles reacciones adversas que no aparecen en este inserto.

- **Frecuentes:** pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas. Sequedad de boca, dolor de cabeza, cansancio y somnolencia/modorra.
- **Poco frecuentes:** pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas. Agotamiento y dolor abdominal.
- **Frecuencia no conocida:** No puede estimarse a partir de los datos disponibles. Se han descrito otros efectos adversos

como palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia), convulsiones, hormigueos, mareos, síncope, temblor, disgeusia (alteración del sentido del gusto), sensación de rotación o movimiento, alteraciones visuales, visión borrosa, crisis oclúgira (movimientos circulares incontrolados de los ojos), dolor o dificultad al orinar, incapacidad para orinar, edema, prurito (picor), sarpullido, urticaria (hinchazón, enrojecimiento y picor de la piel), erupción en la piel, pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA), respiración entrecortada, incremento de peso, dolor muscular, dolor articular, comportamiento agresivo o agitado, alucinación, depresión, insomnio, pensamientos recurrentes o preocupación con el suicidio, pesadillas, hepatitis, función hepática anormal, vómitos, aumento del apetito, náuseas y diarrea. Prurito (picor intenso) cuando se interrumpe el tratamiento, prurito de rebote.

- Ante los primeros signos de reacción de hipersensibilidad, deje de tomar **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL e informe a su médico.

Los síntomas de la reacción de hipersensibilidad pueden incluir: hinchazón de la boca, lengua, cara y/o garganta, dificultad para respirar o tragar (opresión en el pecho o pitidos), habones, disminución repentina de la presión sanguínea que puede derivar en colapso o estado de shock, los cuales pueden ser mortales.

Sobredosis

- **Síntomas:** Si toma más **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL del que debe, en adultos puede causar somnolencia. En niños puede dar inicialmente agitación e inquietud seguido por somnolencia.
- **Tratamiento:** Si usted cree que ha tomado una sobredosis de **Levocet® Forte** jarabe 5 mg / 5 mL, informe a su médico quien decidirá la acción a tomar. No existe ningún antídoto específico conocido contra la levocetirizina. De producirse sobredosis, se recomienda acudir al hospital más cercano. El lavado gástrico se podrá realizar poco después de la ingesta del medicamento. La levocetirizina no se elimina de forma efectiva por hemodiálisis.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano.

Presentaciones comerciales

Caja + Frasco x 180 mL + Jeringa dosificador + Inserto

Caja + Frasco x 120 mL + Jeringa dosificador + Inserto

VENTA LIBRE

Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Elaborado por **Laboratorios Siegfried S.A.**, Guayaquil - Ecuador
Distribuido por **Laboratorios Siegfried S.A.**, Av. República de El Salvador N34-493 y Av. Portugal. Quito - Ecuador.



SIEGFRIED